

Blodfortyndende medicin og Rygkirurgi

Der er en række medicinske præparater og naturlægemidler der kan have indflydelse på blodets evne til at størkne, og dette kan medføre blødningskomplikationer ved en operation. Hvis du skal opereres, beder vi dig derfor være opmærksom på følgende medicin:

Hvis du tager **Marevan®**, skal du holde pause mindst 3-6 dage før operation, afhængig af marevan dosis. Spørg din rygkirurg, hvor mange dage du præcis skal holde pause med, og om du skal tage heparin indsprøjtninger, mens du holder pause med Marevan.

Marcoumar® skal du holde pause med 6 dage før operation. Spørg din rygkirurg, om du skal tage heparin indsprøjtninger, mens du holder pause med Marcoumar.

Pradaxa® skal du holde pause med 3-4 dage før operation, afhængig af din nyrefunktion. Spørg din rygkirurg.

Eliquis® skal du holde pause med 2 dage før operation.

Xarelto® skal du holde pause med 2-3 dage før operation, afhængig af din nyrefunktion. Spørg din rygkirurg.

Hjertemagnyl® skal du holde pause med 3 dage før operation.

Clopidogrel (Plavix®) skal du holde pause med 5-7 dage før operation. Spørg din rygkirurg, hvor mange dage du præcis skal holde pause med.

Brilique® skal du holde pause med 5-7 dage før operation. Spørg din rygkirurg, hvor mange dage du præcis skal holde pause med.

Efient® skal du holde pause med 5-7 dage før operation. Spørg din rygkirurg, hvor mange dage du præcis skal holde pause med.

Persantin® behøver du ikke holde pause med før operation.

Naturlægemidler

Naturlægemidler kan øge risiko for blødning under operationen. Du skal derfor holde pause med disse minimum 7 dage før operation. De mest hyppigst anvendte er listet nedenunder. Nogle præparater skal dog pauseres i lidt flere dage (se antal dages pause i parentes).

Ginkgo Biloba	Hvidløgspræparater	Ginseng
Ingefær	Glucosamin	Baldrian
Fiskeoliekapsler (2 uger)		

Acetylsalicylsyreholdig medicin

Acetylsalicylsyre findes i almindeligt smertestillende håndkøbsmedicin. Indtagelse af acetylsalicylsyreholdig medicin skal ophøre 7 dage før operation. Se listen nedenunder. Nogle præparater skal dog kun pauseres i få dage (se antal dages pause i parentes).

Aspirin®	Kodamid®	Magnyl®
Asasantin® (3-5 dage)	Kodimagnyl®	Treo®

NSAID-holdige gigtmicin

Indtagelse af **gigt-medicin** skal ophøre 3 dage før operation. Nogle præparater skal dog pauseres i lidt flere dage (se antal dages pause i parentes). Se listen nedenunder. Vær særligt opmærksom på indholdsstoffet (står med tykt), da handelsnavnene (står i parentes) kan ændre sig på markedet.

Celecoxib (Celebra®, Celebrex®, Celecoxib®)

Dexibuprofen (Seractil®, Seractiv®)

Dexketoprofen (Dexketoprofen®, Ketesse®)

Diclofenac (Arthrotec®, Diclodan®, Diclofenac®, Diclofenac Rapid®, Diclofenacnatrium®,

Diclone®, Dicuno®, Diklofenak®, Modifenac®, Solaraze® (gel), Voltaren®, Voltaren® (gel))

Etodolac (Etodolac®, Todolac®)

Flurbiprofen (Strefen®)

Ibuprofen (Brufen®, Ibuprofen®, Ibumax®, Ibumetin®, Ibutop®, Iprex®, Pedeax®)

Indometacin (Confortid®)

Lornoxicam (Xefo®)

Nabumeton (Relifex®) (5 dage)

Naproxen (Bonyl®)

Phenylbutazon (Fenylbutazon®) (7 dage)

Piroxicam (Felden®, Pirom®) (5 dage)

Tiaprofensyre (Surgamyl®)

Hvis du ikke kan undvære smertestillende medicin af de nævnte præparater, skal du tale med din rygkirurg om at få et andet præparat.

Såfremt du har spørgsmål til din blodfortyndende eller smertestillende medicin, er du altid velkommen til at kontakte Videncenter for Rygsygdomme, sygeplejerskerne på telefon 3863 3119.